

IMPERMEABILIZANTE FRENTE

Es un producto formulado con una combinación de resinas acrílicas y elastoméricas, las cuales le confieren la propiedad de elasticidad, permitiéndole al film seco soportar pequeñas fisuras. De esta manera, la superficie se mantiene protegida y sellada para evitar infiltraciones del ambiente.

Presentaciones: 1L, 4L, 10 L y 20L.

Aplicación: Podrá aplicarse con rodillo, pincel o soplete.

Rendimiento: 10m² y 12 m² / L por mano.

Colores: más de 1000 colores de diferentes tonalidades.

Dilución: Si fuera necesario, 10% de agua.

Secado: Al tacto, 1 hs aproximadamente. Pintado entre manos, esperar 4 hs; en condiciones normales de humedad y temperatura. Secado final, 48 hs.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Paredes nuevas:

- Limpie la pared, tratando de eliminar polvo, grasa; luego deje secar.
- Aplique Fijador Sellador Wicolor a la totalidad de la superficie a pintar.

- Paredes pintadas:

- Elimine restos de pintura mal adherida o descascarada.
- Limpie la pared para eliminar polvo y grasa, luego deje secar.
- Si la pared tiene hongos, limpie con lavandina y agua, luego deje secar.
- Aplique Fijador Sellador Wicolor a la totalidad de la superficie a pintar.
- En caso de que la pared presente imperfecciones, grietas o agujeros, utilice Enduido para nivelar, luego aplique nuevamente Fijador Sellador Wicolor.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Preparar correctamente la superficie, facilita el trabajo a realizar.
- Mezclar muy bien el contenido del envase.
- No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C; ni en días húmedos.
- Conservar en lugar fresco y seco, al abrigo de la intemperie.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto con la piel y ojos.
- No ingerir.
- Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical.
- Trabaja en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas).

PRIMEROS AUXILIOS

- En contacto accidental con la piel, lavar con agua y jabón.
- En contacto con los ojos, lavar con abundante agua y consultar al médico.
- De ser ingerido, beber abundante agua y consultar al médico.

